

Morphingabe bei Atemnot (Dyspnoe)


Zunehmende Atemnot ist ein Hauptproblem bei Sterbenden

Es gibt freilich verschiedene Möglichkeiten, der Atemnot wirksam zu begegnen. Ein Mensch mit Atemnot soll nicht allein gelassen werden: Eine ruhige Umgebung schaffen und Hektik vermeiden, evtl. Fenster öffnen, Oberkörper hochlagern, nicht zu eng ums Bett stehen. All das können schon hilfreiche Maßnahmen sein.

Atemnot macht Angst, und Angst verstärkt die Atemnot – ein Teufelskreis. Mit der Gabe von Benzodiazepinen (z.B. Tavor® expidet 1,0 mg unter die Zunge) kann dieser Teufelskreis schon durchbrochen werden; es beruhigt, entspannt, macht die Atemmuskulatur wieder lockerer und lindert das Engegefühl im Brustkorb.

Im Krankenhaus oder im Heim wird sehr schnell Sauerstoff angeboten. Bei terminalen Patienten sollte aber immer überlegt werden, ob eine Sauerstoffgabe sinnvoll ist. Oft ist es für Patienten, Angehörige und Pflegende einfach eine Beruhigung, „wenn man etwas tut“.

Ob die Sauerstoffmaske oder -Brille für einen Patienten mit Atemnot immer angenehm ist, ist die andere Frage. Der Fremdkörper in der Nase, die Maske über Nase und Mund ist unangenehm, engt ein, verrutscht oft und Feuchtigkeit sammelt sich an.



Die Zeichnung oben verdeutlicht das Problem: Die belastenden Symptome am Lebensende (neben Schmerzen) sind Durstgefühl und Atemnot. Bei Durst verabreicht man meist Infusionen, bei Atemnot Sauerstoff. Der Sauerstoff trocknet aber die Schleimhäute aus und verursacht wiederum ein stärkeres Durstgefühl. Dem möchte man mit der Gabe von Infusionen begegnen, was zu Wasseransammlung im Körper und in der Lunge führt, was wiederum Atemnot verursacht. Ein Teufelskreis, denn diese Maßnahmen schaden dem Patienten eher als dass sie ihm nutzen.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:

0 86 31 18 57-100

Morphingabe bei Atemnot (Dyspnoe)

In der Palliativmedizin hat man eine andere Antwort gefunden

Wir wissen inzwischen, dass eine angemessen dosierte Morphingabe den Sauerstoffbedarf der Lunge senkt, was eine Linderung der Atemnot zur Folge hat.

Bei Palliativmedizinern ist die Gabe von starken Opioiden zur Behandlung von Atemnot seit langem bekannt.

Die Wirkung ist in einer wissenschaftlichen Studie (Prof. E. Klaschik, Lehrstuhlinhaber für Palliativmedizin, „Symptomatische Therapie der Dyspnoe mit starken Opioiden und deren Einfluss auf die Ventilation“) belegt.

In der Studie wurden folgende Ergebnisse veröffentlicht:

- Die Sauerstoffgabe über Mund und Nase bringt keine Linderung der Atemnot.

Behandlung mit Morphin:

- keine Abnahme des Sauerstoffgehalts im Blut
- kein Anstieg des Kohlensäuregehalts im Blut
- keine Atemdepression unter therapeutischer Dosierung der Morphingabe
- nach Morphingabe konnte eine deutliche Abnahme von Atemfrequenz und Atemnot beobachtet werden.

Das heißt für Patienten und Angehörige, dass Morphingaben in angepasster Dosierung:

- lebenserleichternd, aber nicht lebensverkürzend wirken
- die Atmung sich beruhigt und damit auch die Atemnot und die damit verbundenen Ängste nachlassen.

Die Angst vor Bewusstseinsstörungen und vor Abhängigkeit ist bei richtiger Dosierung unbegründet.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:

0 86 31 18 57-100